



Служба
здравоохранения

снижаем соль в рационе!

Подготовлено:
ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России

Чрезмерное потребление соли повышает артериальное давление и увеличивает риск развития инфаркта и инсульта

Не более 5 грамм соли в день, включая соль, которая содержится в готовых продуктах (хлеб, молочные продукты и др.)

Как снизить количество соли в рационе:



- Исключайте переработанные продукты (соленые, консервы, колбасы, сосиски, мясные деликатесы, соленые закуски и готовые соусы)
- Используйте меньше соли при приготовлении пищи. Многие блюда не требуют соли (салат из свежих овощей, тушеное мясо, птица или рыба)
- Не досаливайте уже приготовленное блюдо! Уберите солонку со стола!
- Заменяйте соль и готовые соусы на сок лимона. Добавьте в блюдо чеснок, имбирь, коренья
- Избегайте замороженных готовых к потреблению продуктов (суп, блинчики, пицца и др.) и полуфабрикатов (пельмени, вареники, котлеты и др.)
- Старайтесь реже питаться вне дома, там Вы не можете контролировать закладку соли в блюдо при приготовлении

Где «скрывается» соль?



1 г соли содержится в 100 г хлеба


1,5-3,5 г соли – в 100 г сыра

1,5-2,0 г соли – в 100 г консервированной продукции

2-2,5 г соли – в 100 г вареной колбасы

3-3,5 г соли – в 100 г копченых продуктов

Узнать больше о
здравом питании
можно на сайте



TAKZDOROVO.RU

